

1. Η συνθετική μαριχουάνα συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Πηγή

Freeman MJ, Rose DZ, Myers MA, Gooch CL, Bozeman AC, Burgin WS. Ischemic stroke after use of the synthetic marijuana "spice". *Neurology*. 2013;81:2090-2093.

2. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων των Η.Π.Α. προειδοποιεί για τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρών δερματικών επιπλοκών σε ασθενείς που λαμβάνουν αντι-επιιμποτική αγωγή με κλοιβαζάμην.

Πηγή

<http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm377204.htm>

3. Οι επισκληρίδιες, παρασπονδυλικές και ενδαρθρικές εγχύσεις μεθυλπρεδνιζόλοντος δύναται να επιπλακούν με σοβαρές μυκοπτοσιακές λοιμώξεις του ΚΝΣ.

Πηγή

Chiller TM, Roy M, Nguyen D, Guh A, Malani AN, Latham R, Peglow S, Kerkering T, Kaufman D, McFadden J, Collins J, Kainer M, Duwve J, Trump D, Blackmore C, Tan C, Cleveland AA, MacCannell T, Muehlenbachs A, Zaki SR, Brandt ME, Jernigan JA; Multistate Fungal Infection Clinical Investigation Team. Clinical findings for fungal infections caused by methylprednisolone injections. *N Engl J Med*. 2013;369:1610-1619.

Επιμέλεια: Γ Τσιβγούλης, Επικ Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ